

1	<i>Alternanthera pungens</i>	Brède emballage à piquants	AMARANTHAC.	S Amérique	
2	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Filao	CASUARINAC.	indopacifique	
3	<i>Chloris barbata</i>		POAC.	cosmopolite	
4	<i>Cynodon dactylon</i>	Petit chiendent	POAC.	paléotropical	
5	<i>Cyperus stoloniferus</i>		CYPERAC.	Indopacifique	EN
6	<i>Desmanthus virgatus</i>		FABAC.	Amérique tropicale	
7	<i>Euphorbia heyneana</i>	Rougette	EUPHORBIAC.	Asie tropicale	
8	<i>Euphorbia reconciliationis</i>		EUPHORBIAC.	Réunion	
9	<i>Fimbristylis cymosa</i>		CYPERAC.	pantropical	
10	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Patate à Durand	CONVOLVULAC.	pantropical	
11	<i>Portulaca oleracea</i>		PORTULACAC.	cosmopolite	
12	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Baie rose	ANACARDIAC.	Amérique du sud	
13	<i>Stylosanthes fruticosa</i>		FABAC.	Afr,Inde,Arabie,Mada,Réu	CR
14	<i>Tephrosia purpurea</i>	Lentille marronne	FABAC.	océan Indien	
15	<i>Tephrosia pumila</i>		FABAC.	océan Indien	CR
16	<i>Trianthema portulacastrum</i>		AIZOAC.	Amérique	
17	<i>Zaleya pentandra</i>	Poupier rouge	AIZOAC.	Arabie, Afr, Mada ,Réunion	VU

Tephrosia pumila :

distane entre les graines (de centre à centre) plus courte que la largeur de la gousse,
 inflorescences rarement plus de 6-flores,
 folioles pubescentes sur la face supérieure.

Tephrosia purpurea :

distane entre les graines (de centre à centre) plus grande que la largeur de la gousse,
 inflorescences généralement amples, pluriflores,
 folioles généralement glabre sur la face supérieure.

Cyperus stoloniferus

Stylosanthes :

Feuilles imparipennées,
 Pétiole partant du sommet d'une gaine stipulaire bien développée,
 Inflorescences composées, contractées,
 Fruit petit, reticulé, à 1 (-2) graines (la deuxième articulation habituellement avortée).

Zaleya pentandra :

Calice accrescent,
 Ovaire rouge